

Tripletherapie mit Boceprevir

Name des Patienten: _____

Geburtsdatum: _____ Patientennummer: _____

Genotyp: _____ Frühere Therapie: _____

Fibrosestadium: _____ Resistenzmutationen: _____

Woche	Therapiebeginn	4	5	6	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	SVR 12
Datum																
Pegyliertes Interferon Dosierung (µg)	START					ABBRUCH bei HCV - RNA ≥ 100 IU/ml			ABBRUCH wenn HCV - RNA nachweisbar	ENDE bei HCV-RNA negativ W8 und W24, naiv, keine Zirrhose					ENDE	
Ribavirin Dosierung (mg)	START					ABBRUCH bei HCV - RNA ≥ 100 IU/ml			ABBRUCH wenn HCV - RNA nachweisbar	ENDE bei HCV-RNA negativ W8 und W24, naiv, keine Zirrhose					ENDE	
Boceprevir Dosierung (mg)			START			ABBRUCH bei HCV - RNA ≥ 100 IU/ml			ABBRUCH wenn HCV - RNA nachweisbar	ENDE bei HCV-RNA negativ W8 und W24, naiv, keine Zirrhose		ENDE bei Relaps/partieller Response ohne Zirrhose			ENDE bei Zirrhose/ Nullresponse	
Komedikation																
Komedikation																
Komedikation																
Labor		4	5	6	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	SVR 12
HCV-RNA IU/ml (Viruslast)																
Hämoglobin																
Neutrophile																
Thrombozyten																
GPT																
TSH																
Nebenwirkungen																